

Сибирская язва – это опасно!

В прошлом сибирская язва была одной из наиболее распространенных и опасных инфекционных болезней, общих для животных и человека, и имела повсеместное распространение на территории России.

В настоящее время эпизоотическая обстановка по сибирской язве остается напряженной.

В связи с регистрацией заболевания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа напоминаем, что

Сибирская язва – остропротекающая инфекционная болезнь, характеризующаяся признаками септицемии и тяжелой интоксикацией, а также образованием карбункулов.

Возбудитель – крупная спорообразующая аэробная палочка.

Споры чрезвычайно устойчивы, они не погибают в разлагающихся трупах, годами сохраняются в воде, десятками лет в почве. Засолка и сушка мяса, кож, свиного сырья способствует сохранению спор.

Наиболее восприимчивы к сибирской язве крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, олени, дикие травоядные всех видов, свиньи. Болеет сибирской язвой и человек.

Продолжительность скрытого периода от нескольких часов до 1-3 дня.

Сибирская язва обычно протекает молниеносно и остро, молниеносное течение сибирской язвы является преобладающим у овец и коз, реже регистрируется у лошадей и КРС. Животные погибают внезапно, клинические признаки болезни трудно заметить, из носовых отверстий и рта выделяется кровянистая пена.

При остром течении у КРС, лошадей отмечают повышение температуры тела (до 41-42°С), учащается дыхание и пульс, появляется мышечная дрожь. Животные отказываются от корма, могут появляться отеки в области глотки и гортани, шеи, подгрудка, живота, через 2-3 дня животные погибают.

При подозрении на сибирскую язву вскрывать трупы запрещено.

Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются, обычно вздуты, окоченение не наступает или слабо выражено, из естественных отверстий выделяется кровянистая жидкость, иногда кровь.

Профилактика и меры борьбы.

1. Главным направлением профилактики сибирской язвы является учет и вакцинация восприимчивых животных.

2. Соблюдение ветеринарно-санитарных требований при перемещениях животных, сырья и продуктов животного происхождения.

3. В обязательном порядке подлежат вакцинации вновь приобретенные животные.

4. Необходимо не допускать бесконтрольный убой животных, соблюдать правила утилизации, уборки и уничтожения трупов.

5. В неблагополучных по сибирской язве пунктах и на угрожаемой территории необходимо строго выполнять ветеринарно-санитарные требования при проведении агрогидромелиоративных строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, особенно вблизи животноводческих ферм и пастбищ.

6. Убой, привитых против сибирской язвы животных на мясо, разрешают не ранее, чем через 14 дней после вакцинации.

7. В случае подозрения на заболевание или внезапного падежа немедленно сообщить в ГБУ «Ветуправление Новокубанского района» по месту жительства.

Администрация ГБУ «Ветуправление Новокубанского района»